

پنج شنبه / ۲۶ خرداد- پیشگیری و تشخیص به هنگام ناباروری در مردان

مقدمه:

یکی از اهداف و شیرینی های زندگی زناشویی مادر و پدر شدن و نعمت داشتن فرزند و بقای نسل است که سبب استحکام خانواده ها می گردد از این رو ناباروری یکی از مسائل آزاردهنده زندگی به شمار می رود.

تعريف ناباروری:

طبق تعريف به زوجيني که پس از يك سال ارتباط زناشویی منظم و بدون استفاده از روش های جلوگیری قادر به بچه دار شدن نباشند زوجين نابارور می گويند. ناباروری می تواند اوليه یا ثانويه باشد. تقريباً ۴۰ درصد ناباروری ها ناشی از عوامل مرتبط با زنان، نظير بسته بودن لوله ها یانداشتن تخمک گذاري است. حدود ۴۰ درصد ناباروری ها نيز ناشی از عوامل مردانه نظير کاهش تعداد يا حرکت اسپرم است. در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد موارد علت ناباروری نامشخص است. به عبارت ديگر عليرغم طبيعی بودن آزمایش ها دليل قطعی برای باردار نشدن وجود ندارد.

علل ناباروری:

عوامل متفاوتی از علل ناباروری به شمار می روند که می تواند مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشد. حدود ۴۰ درصد از مشکلات ناباروری مربوط به مردان، ۴۰ درصد مربوط به زنان و حدود ۱۰ درصد مربوط به هر دو است. در حدود ۱۰ درصد از زوج ها نيز عامل ناباروری مشخص نیست به عبارت ديگر در اين زوج ها هر دو نفر با توجه به انجام آزمایش های موجود مشکلی ندارند ولی به علل نامشخصی بچه دار نمی شوند . فراوانی نسبی علل مختلف ناباروری در جوامع مختلف، متفاوت است و در ب سیاری موارد يك علت خاص برای ناباروری در ارزیابی ها پیدا نمی شود و در تعداد بسيار محدودی از زوجين می توان به طور مطلق علل مادرزادی، اكتسيابي غير قابل برگشيت و يا عدم وجود سيلول جنسی را عامل مشکل ناباروری اعلام نمود. در بين علل ناباروری برخی از آنها شیوع بی شتری داشته و چنانچه زودتر ت شخيص داده شده و درمان شوند هم ناباروری کاهش پیدا می کند و هم عوارض ناشیبي از اين علل کاهش خواهد يافت. آشیيناني با برخی علل شیبيایع و آموزش به گروه هدف درخصوص پیگیری برای تشخيص و درمان اين عوامل امكان درمان موثر و کاهش احتمال ناباروری را فراهم خواهد ساخت.

برخی عوامل موثر در افزایش احتمال ناباروری مردان:

عوامل مختلفی می تواند باروي مردان را تحت تاثير قرار دهد که می توان به موارد زير اشاره کرد : چاقی / تغذيه نامناسب ، مصرف سيگار، قليان، مواد مخدر، الكل، مصرف زياد كافئين، استرس، امواج راديوفرکانس، آلودگی هوا، مواجهه با گرما، کم خوابي، برخی داروها، سموم محبيطي آفت کش ها و سرب، حشره کش ها ، بيماري هايي مانند اوريون، مشكلات هورموني ، راديوبتراپي يا شيمي درمانی و....

توصيه ها:

با توجه به اهمیت بارداری در زمان مناسب برای خانواده و برای پیشگیری و کاهش مشکلات ناشی از به تاخیر انداختن آن موارد زیر را

مد نظر قرار دهید:

در زوجینی که به مدت یک سال خواهان فرزند بوده و نزدیکی منظم بدون استفاده از روش پیشگیری از بارداری داشته اند و باردار نشده اند باستی بررسی از نظر ناباروری صورت گیرد. در خانم های بالاتر از 35 سال، این بررسی باید بعد از 6 ماه صورت گیرد.

تاخیر در فرزندآوری با عوارض بارداری و زایمان همراه است و خانواده هایی که در سنین بالا اقدام به فرزندآوری می کنند باید به این مسایل دقت داشته باشند و از مراقبت های لازم برخوردار شوند.